

ИНСТРУКЦИЯ
для медицинского применения препарата
ПОСТЕРИЗАН

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: 1 суппозиторий содержит: 387,10 мг стандартизованной суспензии культуры бактерий (содержит $6,6 \times 10^8$ E.coli, убитых и законсервированных в 6,6 мг сжиженного фенола);

вспомогательные вещества: твердый жир, масло касторовое полиэтоксилированное, гидрогенизированное.

Лекарственная форма. Суппозитории.

Однородные суппозитории, от белого до бежевого цвета, с характерным запахом фенола.

Название и местоположение производителя.

Др. Каде Фармацевтическая Фабрика ГмбХ, Ригиштрассе, 2, 12277 Берлин, Германия.

Фармакотерапевтическая группа. Средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения.

Код АТС С05А Х.

Препарат стимулирует процессы местного иммунитета за счет антигенного действия, вызывая как неспецифическую, так и специфическую иммунные реакции, вследствие чего повышается местное иммунное сопротивление. Ускоряет и улучшает заживление ран, оказывает противовоспалительный эффект, предупреждает реинфекцию и суперинфекцию.

Показания к применению.

Местное лечение симптомов геморроя.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к действующему веществу или к какому-либо компоненту препарата.

Надлежащие меры безопасности при применении.

В случае грибковых инфекций необходимо одновременно применять местно противогрибковый препарат.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью. Для применения препарата во время беременности или кормления грудью противопоказаний нет.

Способность влиять на скорость реакции при вождении автотранспорта или работе с другими механизмами. Данные отсутствуют.

Дети. Не применяют детям.

Способ применения и дозировки.

Перед применением необходимо осуществить гигиенические процедуры анального участка.

Применяется ректально, взрослым по 1 суппозиторию 2 раза в день (утром и вечером), по возможности после дефекации.

Продолжительность курса лечения определяет врач, в зависимости от характера и течения заболевания. Обычно срок использования составляет 5-7 дней.

Передозировка.

Про случаи передозировки или интоксикации не сообщалось. В случаях случайного перорального введения суппозитория (например, детьми) возможны расстройства желудочно-кишечного тракта (боль в животе, тошнота).

Побочные эффекты.

В некоторых случаях у больных с повышенной чувствительностью к компонентам суппозитория Постеризан может наблюдаться аллергическая реакция кожи.

Фенол, используемый как консервант, может вызывать местное раздражение кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Неизвестно.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей и сухом, защищенном от света месте.

Упаковка. 5 суппозитория упаковываются в стрипы из алюминиевой фольги, покрытой полиэтиленом.

2 стрипа с инструкцией для медицинского применения в картонной упаковке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.